

《12396北京新农村科技服务热线》

图书基本信息

书名：《12396北京新农村科技服务热线咨询问题选编》

13位ISBN编号：9787511607461

10位ISBN编号：7511607462

出版时间：2013-1

出版社：中国农业科学技术出版社

页数：256

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《12396北京新农村科技服务热线》

内容概要

12396北京新农村热线咨询问答选编，ISBN：9787511607461，作者：孙素芬 主编

书籍目录

第一章 蔬菜

一、蔬菜栽培

- (一)瓜类
- (二)番茄、茄子
- (三)辣椒、青椒
- (四)萝卜、白菜及叶菜
- (五)西葫芦及其他
- (六)特菜
- (七)蔬菜综合

二、蔬菜病虫害

- (一)瓜类
- (二)番茄、茄子
- (三)辣椒、青椒
- (四)其他
- (五)综合

第二章 果树

一、果树栽培

- (一)苹果
- (二)梨
- (三)桃
- (四)樱桃
- (五)葡萄
- (六)干果(核桃、板栗、榛子)

.....

第三章 作物栽培

第四章 食用菌栽培

第五章 养殖技术

章节摘录

8.葡萄每年到雨季都烂许多，现在雨季来临，怎么办？ 葡萄烂果主要是两种病害导致，白腐病和炭疽病。葡萄白腐病主要为害果穗，炭疽病主要为害果实。白腐病的发病时间一般在5月下旬，炭疽病一般在7月中旬开始发病，发生时期不同，但用药方面大致相同。 葡萄防寒出土后喷波美5度石硫合剂。生长季节及时喷施1：0.5：200的波尔多液、40%杜邦福星6000～8000倍液、80%代森锰锌500～600倍液、50%多菌灵800倍液、10%世高1500～2000倍液，交替使用3～5次。 对一些高度易感病品种或严重发病地区，可以采用套袋技术防病。 雨季用药要特别注意选择，应该使用残效期在17～21天的药物，每15天喷一次药。若施药间隔期中间降雨，视雨量大小，酌情缩短下次喷药天数。若喷药后即遇大雨，就在天晴后重喷一遍。若相邻两种药分别为碱性或酸性，则严格注意间隔时间，防止两种药酸、碱中和。同时，注意切忌延误喷药时间。 另外，可以结合栽培管理采取措施，降低烂果的发生。主要包括：及时中耕，以增加土壤的通透性，培壮树势；根据地块肥力流失情况和葡萄长势，适加肥量，肥少施、勤施；及时摘心、抹梢，以利通风透光；及时清除田间残枝、枯叶、病果等，减少发病病源。

（六）草莓、西瓜 1.草莓枯萎病如何防治？ 草莓枯萎病主要为害根部，发病病株黄矮，重者枯死，多发生在高温期，以苗期或开花至收获期发病为主。主要通过病株和病土传播，重茬地块或土质黏重、涝洼地都会加重病害的发生。草莓枯萎病应以防为主，综合防治，主要从以下几个方面着手： （1）选用抗病品种，栽植健壮无病种苗。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com