

# 《产科急重症诊疗规范》

## 图书基本信息

书名 : 《产科急重症诊疗规范》

13位ISBN编号 : 9787564125967

10位ISBN编号 : 7564125969

出版时间 : 2010-12

出版社 : 东南大学出版社

作者 : 江苏省卫生厅

页数 : 236

版权说明 : 本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读 , 请支持正版图书。

更多资源请访问 : [www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《产科急重症诊疗规范》

## 内容概要

《产科急重症诊疗规范》为认真贯彻落实国家和省关于加强妇幼保健工作的部署要求，切实加强医疗卫生机构产科急救服务的规范化管理，提高救治能力和水平，进一步降低可避免的孕产妇和婴儿死亡，江苏省卫生厅根据对全省助产技术服务质量和孕产妇死亡原因分析，筛选出74种常见的、对孕产妇和婴儿身体健康和生命安全影响较大的产科急重症，编写了这本《产科急重症诊疗规范》。《产科急重症诊疗规范》编写过程中，我们参考了国际、国内相关的指导用书，坚持简明、实用、有效的原则，突出诊断、治疗服务的规范性，力求做到内容先进、使用便捷，以促进产科急重症诊治能力与水平的提高。

# 《产科急重症诊疗规范》

## 书籍目录

### 第一章 产科急症

- 第一节 未足月胎膜早破
  - 第二节 双足先露和单足先露
  - 第三节 胎儿窘迫
- 第二章 产科严重并发症
- 第一节 妊娠期并发症
    - 一、重度子痫前期
    - 二、早发型重度子痫前期
    - 三、子痫
    - 四、HELLP综合征
    - 五、重度妊娠期肝内胆汁淤积症
    - 六、早产
    - 七、前置胎盘
    - 八、凶险型前置胎盘
    - 九、胎盘早剥
    - 十、胎盘植入

### 第二节 双胎与多胎

- 一、双胎输血综合征
- 二、双胎一死一活(双胎之一死亡)
- 三、双胎发育不均衡(双胎生长不一致)
- 四、双胎之一合并畸形
- 五、三胎及以上多胎妊娠

### 第三节 分娩期并发症

- 一、产后出血
- 二、严重软产道裂伤
- 三、先兆子宫破裂及子宫破裂
- 四、忽略性横位
- 五、脐带脱垂
- 六、肩难产
- 七、羊水栓塞

### 第四节 晚期产后出血

## 第三章 妊娠合并严重内、外、妇科疾病

### 第一节 妊娠合并严重血液系统疾病

- 一、妊娠合并血友病
- 二、妊娠合并白血病
- 三、妊娠合并再生障碍性贫血
- 四、妊娠合并重度血小板减少症
- 五、妊娠合并中重度贫血

### 第二节 妊娠合并心脏病

- 一、妊娠合并先天性心脏病
- 二、妊娠合并风湿性心脏病
- 三、妊娠合并冠心病
- 四、妊娠合并换瓣术后抗凝药的应用
- 五、妊娠合并心力衰竭
- 六、妊娠合并室性心律失常
- 七、妊娠合并阵发性室上性心动过速
- 八、妊娠合并房扑、房颤

# 《产科急重症诊疗规范》

第三节 妊娠合并糖尿病(妊娠合并糖尿病酮症酸中毒)

第四节 妊娠合并甲状腺危象

第五节 妊娠期急腹症

- 一、妊娠合并卵巢囊肿蒂扭转
- 二、妊娠合并子宫肌瘤红色变性
- 三、妊娠合并急性阑尾炎
- 四、妊娠合并肠梗阻
- 五、妊娠合并急性胆囊炎
- 六、妊娠合并急性胃穿孔
- 七、妊娠合并急性腹膜炎
- 八、妊娠合并尿路结石
- 九、妊娠合并急性胰腺炎

第六节 妊娠合并风湿病

- 一、妊娠合并系统性红斑狼疮
- 二、妊娠合并干燥综合症

第七节 妊娠合并急、慢性肾功能衰竭

第八节 妊娠合并严重肝病

- 一、妊娠合并肝硬化
- 二、妊娠期急性脂肪肝
- 三、妊娠合并重症肝炎

第九节 妊娠合并严重呼吸系统疾病

- 一、妊娠合并重症肺炎
- 二、妊娠合并急性呼吸窘迫综合症
- 三、妊娠合并哮喘的急性发作
- 四、妊娠合并重度哮喘发作

第十节 妊娠合并严重神经系统疾病

- 一、妊娠合并脑血管疾病
- 二、妊娠合并多发性硬化
- 三、妊娠合并格林—巴利综合征
- 四、妊娠合并脑炎
- 五、妊娠合并颅内压增高

第十一节 产科各种部位栓塞

- 一、产科肺栓塞
- 二、产科下肢静脉血栓
- 三、产科颅内静脉窦血栓

第十二节 妊娠合并妇科疾病

- 一、妊娠合并巨大子宫肌瘤
- 二、妊娠合并严重子宫畸形
- 三、妊娠合并双子宫

第四章 妊娠期获得性免疫缺陷综合征

第五章 妊娠期B族链球菌感染

# 《产科急重症诊疗规范》

## 章节摘录

版权页：【概述】在子痫前期的基础上患者发生抽搐或伴昏迷称为子痫，是中枢神经系统缺血缺氧的表现，也是妊娠期高血压疾病最严重的阶段。多数在子痫前期基础上发作，亦可不经过子痫前期阶段而突发子痫。子痫多发生在妊娠晚期及临产前，即产前子痫；部分发生在分娩过程中，即产时子痫；较少发生在产后24~72小时，即产后子痫。【诊断标准】1.临床表现（1）妊娠20周后出现高血压、蛋白尿，伴有或不伴有各种不适主诉。（2）突然发作抽搐或进入昏迷。其特点为：发作时开始于面部，眼球固定，瞳孔放大，面向一侧歪曲，牙关紧闭，口角及面肌颤动，继而全身及四肢肌强直，双手臂曲屈握拳，腿部旋转，约持续10余秒，全身上下肢迅速强烈阵挛。抽搐时呼吸暂停，面色青紫，口吐白沫，历时1~2分钟。抽搐发作前及抽搐期间，神志丧失。昏迷后常有鼾声，少数患者抽搐后立即清醒，亦可停止片刻再发生抽搐。抽后血压常上升，少尿或无尿，尿蛋白增加。

# 《产科急重症诊疗规范》

## 编辑推荐

《产科急重症诊疗规范》是由东南大学出版社出版的。

# 《产科急重症诊疗规范》

## 精彩短评

- 1、写得还是比较简单
- 2、很好，正版书，希望对我以后的工作有很大帮助
- 3、虽然小小的一本，内容非常丰富，可惜书面有点划花
- 4、排版、内容、权威性都满意
- 5、书写十分不错，适合临床操作
- 6、书很实用，很专业
- 7、新书一枚，还没看，质量很好

# 《产科急重症诊疗规范》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)