

《西京产科医师手册》

图书基本信息

书名 : 《西京产科医师手册》

13位ISBN编号 : 9787560538242

10位ISBN编号 : 756053824X

出版时间 : 2011-4

出版社 : 西安交通大学出版社

页数 : 317

版权说明 : 本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读 , 请支持正版图书。

更多资源请访问 : www.tushu000.com

《西京产科医师手册》

内容概要

《西京产科医师手册》系统全面的介绍国内外围产期处理的最新理论和诊疗技术，目的是为临床医生，特别是临床经验不够丰富的住院医生提供规范操作的参考。《西京产科医师手册》主要分为五大部分：产科常用处理技术、产科常见疾病和并发症的处理、终止妊娠技术、正常新生儿处理及常见新生儿疾病。产科常用技术介绍了分娩常识、正常与异常分娩的诊断及处理原则、各类催产及助产技术、以及产科超声和胎心监护技术。产科常见疾病及并发症的处理主要介绍了妊娠期感染、妊娠时限异常、多胎妊娠、妊娠期特有疾病、妊娠合并内科疾病、内分泌疾病、恶性肿瘤以及常见分娩期并发症的诊断处理原则。终止妊娠技术介绍了各期终止妊娠的技术方法及注意事项。正常新生儿护理介绍了产房及婴儿室日常工作流程，正常新生儿生理变化及新生儿出生后护理及喂养。新生儿疾病介绍了新生儿窒息抢救、新生儿黄疸、肺炎、呼吸窘迫综合征、缺血缺氧性脑病以及高危新生儿的护理。《西京产科医师手册》立题为《围生期临床实践备要》，就是希望尽可能的涵盖围生期高危妊娠的监护、分娩期监护及新生儿保健的处理纲要，为临床产科医生提供一本可操作性强的参考书。

《西京产科医师手册》

作者简介

陈必良，教授、主任医师、硕士研究生导师、第四军医大学西京医院妇产科主任。兼任全军妇产优生专业委员会副主任委员、陕西省围产医学会副主任委员、陕西省妇产学会常委、陕西省妇女保健学会常委、陕西省中西医结合妇产科学会委员、西安市妇产科学会常委、陕西省医疗事故评定专家组成员、《中国实用妇科与产科杂志》特约审稿专家、《中国全科医学》杂志特约审稿专家、《中国妇幼健康研究》杂志编委。长期从事妇产科学医疗、教学、科研工作。擅长妇科肿瘤诊断及各种疑难手术，对高危妊娠的合理化、规范化处理积累了丰富经验。在环境污染物对生殖健康的影响、妊娠相关疾病、优生遗传、出生缺陷预防等方面均有深入的探究。承担国家自然科学基金1项，国蒙教育部、卫生部科研课题1项，参加国家自然科学基金课题3项，承担陕西自然基金1项。获军队科技进步二等奖1项，陕西省科技进步二等奖项，军队科技进步三等奖1项。马向东，博士、副教授、副主任医师、硕士研究生导师。兼任中国老！年学学会骨质疏松委员会委员、《中华中西医杂志》常务编委、中华医学：会妇产科分会会员、国家自然科学基金委员会评审专家。完成国家自然科学基金青年基金项目2项，在研留学回国人员科研启动基金1项，西京医院医疗新技术、新业务项目1项，校青年基金科研项目1项。获陕西省科技进步二等奖2项，军队科技进步三等奖1项。国家核心期刊发表中文学术论著36篇，综述、译文8篇，SCI收录英文学术论著8篇。主编及参编著作5部。

《西京产科医师手册》

书籍目录

产科常用处理技术

?分娩常识

?肛门检查

?阴道检查

?产程图

?正常产程

?难产诊断

?潜伏期进展异常的处理

?活跃期进展异常的处理

?第二产程进展异常的处理

?人工剥膜术

?人工破膜术

?外阴切开及缝合术

?子宫颈切开缝合术及裂伤修补术

?产钳术

?胎头吸引术

?臀位助产术

?分娩镇痛

?产科超声检查

?气囊助产

?电子胎心监护

?产科催产与引产技术

?缩宫素临床应用

产科常见疾病及并发症处理

?妊娠期腹痛

?孕产妇及围生期感染

?流产

?早产

?叶酸与神经管缺陷的预防

?异位妊娠

?双胎(多胎)妊娠

?母儿血型不合

?妊娠期高血压疾病

?心脏疾病与妊娠

?妊娠有关的肝脏疾病

?妊娠合并恶性肿瘤

?产科血栓形成问题

?围生期急性肾功能衰竭

?妊娠期合并糖尿病

?剖宫产术后阴道分娩

?产后出血与出血性休克

?羊水栓塞

终止妊娠技术

?早期妊娠流产术

?中期妊娠引产术

?复杂人工流产术

.....

《西京产科医师手册》

正常新生儿护理
常见新生儿疾病处理

《西京产科医师手册》

章节摘录

版权页：插图：产程图，是将宫口扩张和先露下降的速度用两条曲线描绘成坐标图，用来判断产程正常或异常的一种方法。1954年，Friedman首先提出应用产程图观察产程，该方法现已被公认为一种较好的描述产程经过的方法。国内多采用交叉型产程图，介绍如下。**【绘制方法】**产程图横坐标以小时为单位，表示产程时间；纵坐标以厘米为单位，左侧表示宫颈口扩张程度，右侧表示胎先露下降程度（图1）。“O”代表坐骨棘水平。为了排除假临产，当产程中宫颈口扩张2 cm以上时才开始绘制产程图，借助产程图掌握临产时间、产程进展，便于对产妇状态进行分析，拟定进一步处理方案。宫颈扩张曲线自下而上、自左向右在相应位置用“红圈”标记，并连线；胎先露下降曲线自左向右、自上往下将每次检查先露下降程度在产程图相应位置用“蓝叉”标记并连线。正常情况下，两根曲线在宫颈口开4~5 cm时互相交叉。胎儿娩出时间用红笔画圈，中间用红笔画叉表示。宫颈扩张有一定规律性，正常可分为三期：潜伏期——规律宫缩开始至宫颈口扩张3 cm，约需8h活跃期——宫颈口扩张3~9 cm，约需3h减速期——宫颈口扩张9 cm至开全，约需th**【正常产程图】**1972年，Philpott提出了在产程图中增加警戒线和处理线，为基层产科工作人员制定一个简单、明确地判定分娩可能发生异常的标准。

《西京产科医师手册》

编辑推荐

《西京产科医师手册》为临床医师工作指南系列之一。

《西京产科医师手册》

精彩短评

1、帮朋友买的，不错，推荐

《西京产科医师手册》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com