

《新特药评介手册》

图书基本信息

书名：《新特药评介手册》

13位ISBN编号：9787810618762

10位ISBN编号：7810618768

出版时间：2004-10

出版社：

作者：陈孝治 编

页数：531

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《新特药评介手册》

内容概要

《新特药评介手册》针对临床医务人员急需新药详细资料，以保证新药的合理、安全、高效使用而编写。共收载近3年来用于临床治疗的中西新药（包括新制剂）122种，按药理作用分17章。除对药理、适应证、禁忌证、用法用量、不良反应、注意事项等一般药物手册必须有的内容做了较为详尽的介绍外，增加了对新药应了解掌握的化学结构式、毒理作用、药物动力学、药物相互作用、药物过量、临床评价等新内容。其中重点突出“临床评价”，该项不仅较全面地收集了国内外各药的“临床试验”循证医学资料，而且对其疗效和安全性给予了恰当的客观评价，可作为临床选择新药的证据参考。因此，《新特药评介手册》可供广大医护工作者、临床药师及各药厂技术人员使用。

书籍目录

1 抗微生物药物艾克儿 / 1 施复捷 / 4 全泽复 / 10 高德 / 15 泰吡信 / 20 克倍宁 / 24 安素美 / 30 迪迈欣 / 35 诺邦 / 41 他格适 / 46 筠菲 / 52 海超 / 55 拜复乐 / 61 潇然 / 64 伏立康唑 / 682 止痛、解痉药泰德洛 / 73 尤舒 / 77 姜酚 / 82 斯帕丰 / 853 神经、精神系统药物赛百注射用纤溶酶 / 90 天眩清 / 97 健朗星 / 100 泰亚普昔 / 103 施捷因 / 107 思诺思 / 1124 麻醉用药速卡 / 117 耐乐品 / 121 力蒙欣 / 1265 循环系统药物本悦 / 132 瑞泰 / 136 达爽 / 141 必洛斯 / 146 美卡素 / 151 血塞通 / 154 凯时 / 157 波立维 / 161 百奥 / 166 克赛 / 169 腺苷 / 1786 泌尿系统药物利了 / 183 科力定 / 189 舍尼亭 / 192 爱普列特 / 197 那妥 / 200 雷卡 / 2057 呼吸系统药物枢维新 / 210 奕利 / 213 海王维畅 / 217 顺尔宁 / 220 固尔苏 / 2248 消化系统药物欣洛维 / 229 自维 / 231 威地美 / 235 耐信 / 238 波利特 / 249 达吉 / 249 瑞复淋 / 251 泽马可 / 256 得舒特 / 260 定君生 / 262 艾者思 / 264 恒康正清 / 267 天晴康欣 / 272 百赛诺 / 277 注射用核糖核酸 / 280 肝苏颗粒 / 283 乌斯他丁 / 2869 血液系统药物巴曲亭 / 292 福欣康林 / 296 罗可曼 / 29810 内分泌系统药物赛治 / 303 亚莫利 / 307 达美康缓释片 / 311 倍欣 / 315 诺和龙 / 320 诺和锐 / 323 来得时 / 328 固苏梭 / 33511 免疫系统药物赛升薄芝糖肽注射液 / 341 普利莫 / 345 华森水王 / 349 普乐可复 / 352 骁悉 / 358 人乙型肝炎免疫球蛋白 / 362 华兰迪安 / 365 派罗欣 / 36712 抗肿瘤药物健择 / 373 希罗达 / 378 诺雷德 / 382 瑞宁得 / 386 赫赛汀 / 392 康士得 / 397 民诺宾 / 400 开普拓 / 404 泰素 / 409 泰索帝 / 414 伯尔定 / 420 奥铂 / 42413 抗过敏药物皿治林 / 430 芙必叮 / 43414 水、电解质平衡药物伸宁 / 43815 解毒药物长托宁 / 44316 外用药利百素 / 450 兰美抒乳膏 / 453 迈可抒 / 456 明欣利迪 / 460 星瑞灵 / 463 康普欣 / 46717 中成药痰热清注射液 / 472 元胡止痛软胶囊 / 477 疏血通 / 479 泰脂安胶囊 / 482 参松养心胶囊 / 485 六味地黄软胶囊 / 489 宁泌泰 / 491 野马追 / 494 复方丁香开胃贴 / 497 裸花紫珠片 / 499 裸花紫珠栓 / 502 强骨胶囊 / 503 康赛迪 / 507 艾迪 / 511 外文药索引 / 515 中文药名笔画索引 / 520 中文药名汉语拼音索引 / 526

章节摘录

插图：【禁忌证】禁用于对头孢菌素类过敏患者。【注意事项】 使用本品治疗前，应仔细询问患者是否有头孢丙烯或其他头孢菌素类药物、青霉素类及其他药物的过敏史。有青霉素过敏史患者服用本品应谨慎。凡以往有青霉素类药物所致过敏性休克史或其他严重过敏反应者不宜使用本品。如发生过敏反应，应停止用药。严重过敏反应需使用肾上腺素并采取其他紧急措施。包括给氧、静脉输液，静脉注射抗组胺药、皮质激素、升压药及人工呼吸。 几乎所有抗菌药物包括头孢丙烯长期使用可引起非敏感性微生物的过度生长，改变肠道正常菌群，诱发二重感染，尤其是假膜性肠炎。因此应仔细观察用药患者服药后的反应，特别注意对继发腹泻患者的诊断。如在治疗期间发生二重感染，应采取适当的措施。对假膜性肠炎患者，轻度病例仅需停用药物，而中至重度病例，根据临床症状采取调节水和电解质平衡、补充蛋白和用对耐药菌有效的抗菌药物等治疗。【药物过量】头孢丙烯主要经肾脏清除，对严重过量，尤其是肾功能损伤患者，血液透析有助于头孢丙烯清除。

《新特药评介手册》

编辑推荐

《新特药评介手册》是由中南大学出版社出版的。

《新特药评介手册》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com